



Ontdekker:	A. Humboldt, A Bonpland en K.S. Kunth (1823)
Vindplaats:	Mexico: van de Sierra Madre Occidental van Sinaloa en Durango tot Jalisco en oostwaarts over de Trans-Mexicaanse vulkanen gordel tot Vera Cruz.
Bloeiseizoen:	
Hoogte:	Op een hoogte van 2100 tot (2500) 3200 m.
Bloembuis:	Groenwit naar roze
Kelkbladen:	Groenwit naar roze
Kroonbladen:	Groenwit naar roze, verkleurend naar paars bij verouderen.
Helmdraad:	
Helmknop:	
Stuifmeel:	
Stijl:	
Stempel:	
Bloei:	
Bloeitijd Nederland:	In de zomer periode.
Knop:	
Bes:	
Blad:	Breed elliptisch tot ovaal, 8-30 mm lang en 6-15 mm breed. Licht tot middel groen.
Aantal chromosomen	22
Groeiwijze:	Struik 0,5-2,2 m.
Verzorging:	
Bijzonderheden:	Tweehuizig met enkele tweeslachtige bloemen op een plant met vrouwelijke bloemen.
Synoniem namen:	<i>Brebissoniathymifolia</i> , (Kunth) Spach 1835; <i>Lyciopsisthymifolia</i> , (Kunth) Spach 1835, <i>F. pringlei</i> , Robinson & Seaton 1893; <i>F. colimae</i> , Munz 1943